

Formelzettel Mathematik B (ET)

LV-Nr. 503.053, Sommersemester 2023

Kapitel F: Integration I

Grundlegende Integrale:

- $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan(x) + C_1 \quad \text{oder wahlweise} \quad \int \frac{1}{1+x^2} dx = -\operatorname{arccot}(x) + C_2$
- $\int \frac{1}{1-x^2} dx = \begin{cases} \operatorname{artanh}(x) + C & \text{für } |x| < 1, \\ \operatorname{arcoth}(x) + C & \text{für } |x| > 1. \end{cases}$
- $\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx = \operatorname{arsinh}(x) + C$
- $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin(x) + C_1 \quad \text{oder wahlweise} \quad \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = -\arccos(x) + C_2$
- $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx = \operatorname{arcosh}(x) + C$

Rationale Funktionen:

- Falls $\frac{\beta^2}{4} - \gamma < 0$: $\int \frac{b_k x + c_k}{(x^2 + \beta x + \gamma)^k} dx = \frac{b_k}{2} f_{k-1}(x) + \frac{2c_k - b_k \beta}{2w^{2k-1}} \int \frac{1}{(y^2+1)^k} dy \quad \text{mit } w = \sqrt{\gamma - \frac{\beta^2}{4}},$
 $y = \frac{1}{w} \left(x + \frac{\beta}{2} \right) \text{ und } f_{k-1}(x) = \begin{cases} \ln(x^2 + \beta x + \gamma) & \text{für } k = 1, \\ -\frac{1}{(k-1)(x^2 + \beta x + \gamma)^{k-1}} & \text{für } k > 1. \end{cases}$
- $\int \frac{1}{(y^2+1)^k} dy = \begin{cases} \arctan(y) + C & \text{für } k = 1, \\ \frac{y}{2(k-1)(y^2+1)^{k-1}} + \frac{2k-3}{2k-2} \cdot \int \frac{1}{(y^2+1)^{k-1}} dy & \text{sonst.} \end{cases}$

Integrale rationaler Funktionen in Sinus und Cosinus:

- Standardsubstitution $u = \tan\left(\frac{x}{2}\right) \iff x = 2 \arctan(u)$
- Dann ist $\sin(x) = \frac{2u}{1+u^2}, \quad \cos(x) = \frac{1-u^2}{1+u^2}, \quad dx = \frac{2}{1+u^2} du$

Kapitel F: Integration II

Integralsätze in der Ebene:

- *Gegeben:* Geschlossene Kurve C , die Gebiet B berandet. Auf $B \cup C$ differenzierbares Vektorfeld \vec{F} . Parametrisierung $C = \begin{pmatrix} x(s) \\ y(s) \end{pmatrix}$ durch Bogenlänge, Normalvektor $\vec{n}(s) = \begin{pmatrix} \dot{y}(s) \\ -\dot{x}(s) \end{pmatrix}$.
- **Satz von Gauß:** $\iint_B \operatorname{div}(\vec{F}) dxdy = \oint_C \langle \vec{F}, \vec{n} \rangle ds$
- **Satz von Stokes:** $\iint_B \operatorname{rot}(\vec{F}) dxdy = \oint_C \vec{F} ds$
- **Greensche Formeln:** f, g auf $B \cup C$ zweimal differenzierbar. Dann:

$$\iint_B \left(f \Delta g + \langle \nabla f, \nabla g \rangle \right) dxdy = \oint_C f \frac{\partial g}{\partial \vec{n}} ds \quad (1. \text{ Greensche Formel})$$

$$\iint_B \left(f \Delta g - g \Delta f \right) dxdy = \oint_C \left(f \frac{\partial g}{\partial \vec{n}} - g \frac{\partial f}{\partial \vec{n}} \right) ds \quad (2. \text{ Greensche Formel})$$

wobei $\Delta f = f_{xx} + f_{yy}$ und $\Delta g = g_{xx} + g_{yy}$.

Kapitel I: Differentialgleichungen

- DGL der Form $y' = f\left(\frac{x}{y}\right)$: Substitution $z(x) = \frac{y(x)}{x} \rightarrow \text{DGL } z' = \frac{1}{x}(f(z) - z)$

- DGL der Form $y' = a_1(x)y + a_0(x)$: Spezielle Lösung $y_{\text{sp}} = e^{A(x)} \int \frac{a_0(x)}{e^{A(x)}} dx$ mit $A(x) = \int a_1(x) dx$

- **Bernoullische DGL** $y' = a(x)y + b(x)y^\alpha$ mit $\alpha \neq 0, 1$:

$$\text{Substitution } z = y^{1-\alpha} \rightarrow \text{DGL } z' = (1-\alpha)a(x)z + (1-\alpha)b(x)$$

- **Riccati'sche DGL** $y' = a(x)y + b(x)y^2 + c(x)$:

Übliche Ansätze für spezielle Lösung: $y_{\text{sp}} = \alpha x^\beta$, $y_{\text{sp}} = \alpha e^{\beta x}$, $y_{\text{sp}} = \alpha_1 x^{\beta_1} + \alpha_2 x^{\beta_2}$.

$$\text{Substitution } v = y - y_{\text{sp}} \rightarrow \text{Bernoullische DGL } v' = (a(x) + 2b(x)y_{\text{sp}}(x))v + b(x)v^2$$

- **Exakte DGL** $A(x, y) + B(x, y)y' = 0$ mit $A_y = B_x$: Allgemeine Lösung $F(x, y) = c \in \mathbb{R}$ mit

$$F(x, y) = \int A(x, y) dx + \varphi(y) \quad \text{wobei } \frac{d}{dy} \left(\int A(x, y) dx \right) + \varphi'(y) = B(x, y)$$

oder

$$F(x, y) = \int B(x, y) dy + \psi(x) \quad \text{wobei } \frac{d}{dx} \left(\int B(x, y) dy \right) + \psi'(x) = A(x, y)$$

- **Integrierender Faktor** bei DGL $A(x, y) + B(x, y)y' = 0$ mit $A_y \neq B_x$: $\mu(x, y)$ mit $\mu A + \mu B y' = 0$ exakt

- Falls $\frac{A_y - B_x}{B}$ nur von x abhängig: $\mu(x) = \exp \left(\int \frac{A_y - B_x}{B} dx \right)$
- Falls $\frac{A_y - B_x}{A}$ nur von y abhängig: $\mu(y) = \exp \left(\int \frac{B_x - A_y}{A} dy \right)$

- **Lineare DGL mit konstanten Koeffizienten** $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_0y = b(x)$:

Ansätze für spezielle Lösung:

Typ $b(x)$	Typ Ansatz $y_{\text{sp}}(x)$	λ
$P(x)$	$Q(x) \cdot x^{\mu(\lambda)}$	0
$e^{\alpha x}P(x)$	$e^{\alpha x}Q(x) \cdot x^{\mu(\lambda)}$	α
$P_1(x) \sin(\beta x) + P_2(x) \cos(\beta x)$	$(Q_1(x) \sin(\beta x) + Q_2(x) \cos(\beta x)) \cdot x^{\mu(\lambda)}$	βi
$e^{\alpha x}(a \sin(\beta x) + b \cos(\beta x))$	$e^{\alpha x}(c \sin(\beta x) + d \cos(\beta x)) \cdot x^{\mu(\lambda)}$	$\alpha + \beta i$

Hierbei bezeichnet $\mu(\lambda)$ die Vielfachheit von λ als Nullstelle des charakteristischen Polynoms der zugehörigen homogenen DGL. Die Grade der unbekannten Polynome im Ansatz werden ebenso groß gewählt wie der größte Grad in den entsprechenden Polynomen in $b(x)$.

- **Variation der Konstanten** bei DGL $y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = b(x)$: Spez. Lösung $y_{\text{sp}} = C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2$ mit $C_1 = - \int \frac{b(x)y_2(x)}{W(x)} dx$ und $C_2 = \int \frac{b(x)y_1(x)}{W(x)} dx$, wobei y_1, y_2 Fundamentalsystem der homogenen DGL und $W(x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y'_1(x) & y'_2(x) \end{vmatrix}$.

- **Lineare Systeme mit konstanten Koeffizienten** $\vec{y}' = A\vec{y} + \vec{b}(x)$: Ansatz für spezielle Lösung ist

$$\vec{y}_{\text{sp}}(x) = e^{\lambda x} \begin{pmatrix} Q_1(x) \\ \vdots \\ Q_n(x) \end{pmatrix}, \quad \text{falls } \vec{b}(x) = e^{\lambda x} \begin{pmatrix} P_1(x) \\ \vdots \\ P_n(x) \end{pmatrix}.$$

Dabei sind Q_1, \dots, Q_n unbekannte Polynome vom Grad $\max\{\deg(P_1), \dots, \deg(P_n)\} + \mu(\lambda)$