

Aufgabe 55. Gegeben sei eine Blockdiagonalmatrix mit folgenden Jordanblöcken $J_k(\lambda)$:

$$A = \begin{bmatrix} J_2(0) & & & & & & \\ & J_3(0) & & & & & \\ & & J_3(0) & & & & \\ & & & J_1(1) & & & \\ & & & & J_1(1) & & \\ & & & & & J_2(1) & \\ & & & & & & J_3(1) \\ & & & & & & & J_5(1) \end{bmatrix}$$

wobei $J_k(\lambda)$ einen Jordanblock der Länge k zum Eigenwert λ bezeichnet. Berechne $\dim \ker(\lambda I - A)^k$ für $\lambda \in \{0, 1\}$ und $0 \leq k \leq 20$ sowie Basen aller Eigenräume und Haupträume.

Aufgabe 56. Von einer Matrix $A \in \mathbb{C}^{20 \times 20}$ sind die folgenden Kerndimensionen bekannt:

k	1	2	3	4	5	6	7
$\ker(A - 2I)^k$	1	2	3	4	5	6	6
$\ker(A - I)^k$	0	0	0	0	0	0	0
$\ker A^k$	3	4	5	6	7	7	7
$\ker(A + I)^k$	3	6	6	6	6	6	7
$\ker(A + 2I)^k$	0	1	1	1	1	1	1

- (a) Zwei Zahlen in der Tabelle sind falsch. Finde und korrigiere sie.
 (b) Bestimme eine Jordansche Normalform und das Minimalpolynom von A .

Aufgabe 57. Die Matrix

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 5 & 7 & 12 & 12 & 6 \\ 0 & -3 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ -5 & -1 & -5 & -7 & -7 & -4 \\ 2 & -3 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ -6 & 6 & -8 & -6 & -5 & -4 \\ 4 & -10 & 7 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

hat das charakteristische Polynom $\chi_A(x) = (x - 1)^3(x + 1)^3$.

- (a) Bestimme zu jedem Hauptraum $\ker(\lambda_i - A)^{r_i}$ eine Basis $(u_1^{(i)}, u_2^{(i)}, \dots, u_{n_i}^{(i)})$ dergestalt, daß jeweils $(u_1^{(i)}, u_2^{(i)}, \dots, u_{m_{i,k}}^{(i)})$ eine Basis von $\ker(\lambda_i - A)^k$ ist.
 (b) Bestimme eine Jordansche Normalform J und das Minimalpolynom von A sowie eine reguläre Matrix B , sodaß $B^{-1}AB = J$.