2. Zusatzblatt zur Linearen Algebra 2

T2.1. (Adjungierte Abbildungen, II)

Betrachten Sie die linearen Abbildungen $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ aus Aufgabe T1.1:

$$(a) f(v) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 0 \\ 5 & 6 & 1 \end{pmatrix} v;$$

$$(b) f(v) = v - 2\langle b, v \rangle b \text{ mit } b = (1, 1, 3)/\sqrt{11};$$

$$(c) f(v) = v \times b \text{ mit } b = (2, 1, -1);$$

$$(d) f = p_U, \text{ die orthogonale Projektion auf den Unterraum } U = \text{span}\{(1, 1, 0), (3, 5, 7)\}.$$

Welche davon sind selbstadjungiert, normal, bzw. orthogonal?

T2.2. (Abstandsberechnungen)

Wir betrachten die Gerade $L = b + \mathbb{R}v = (0, -2, 0) + \mathbb{R}(1, 1, 0) \subset \mathbb{R}^3$ und den Punkt $a = (0, 0, 1) \in \mathbb{R}^3$.

(a) Berechnen Sie den Abstand $d(a, L)$ mittels elementargeometrischen Überlegungen.

(b) Aus Aufgabe 6.3 (c) kennen Sie die Formel

$$d(a', b' + \mathbb{R}v') = \frac{|\langle n, a' - b' \rangle|}{\|n\|}$$

zwischen einem Punkt $a' \in \mathbb{R}^2$ und einer Geraden $b' + \mathbb{R}v' \subset \mathbb{R}^2$, wobei $n \in \mathbb{R}^2$ einen Vektor $\neq 0$ mit $n \perp v'$ bezeichnet. Zeigen Sie, dass sich diese Formel nicht unbedingt wörtlich ins Dreidimensionale überträgt, indem Sie einen Vektor $n \in \mathbb{R}^3$, $n \neq 0$, mit $n \perp (1, 1, 0)$ und

$$d(a, L) \neq \frac{|\langle n, a - b \rangle|}{\|n\|}$$

finden.

(c) Verifizieren Sie die merkwürdige Formel $d(a, L) = \frac{|\langle n, a - b \rangle|}{\|n\|}$ für $n = v \times (v \times (a - b))$ am vorliegenden Zahlenbeispiel. Geben Sie eine anschauliche Begründung für die Richtigkeit dieser Formel.

(d) Zeigen Sie mittels Satz 7.4.8:

$$\{u \in L : \forall u' \in L: \|a - u\| \leq \|a - u'\|\} = \{b + Ax : x \in \mathbb{R}, A^*Ax = A^*(a - b)\}$$

für $A = (v) = \mathbb{R}^{3 \times 1}$.

- (e) Berechnen Sie A^*A , $A^*(a - b)$ und lösen Sie $A^*Ax \stackrel{!}{=} A^*(a - b)$.
 (f) Benutzen Sie Ihr Ergebnis aus (e), um Ihre Antwort auf (a) zu verifizieren.

T2.3. (Unitäre Matrizen)

Bei A und B handle es sich im Folgenden um unitäre $n \times n$ -Matrizen.

(a) Zeigen Sie, dass A invertierbar ist.

(b) Zeigen Sie, dass AB auch unitär ist.

(c) Zeigen Sie, dass die Matrix $A = \begin{pmatrix} i & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ unitär ist.

(d) Zeigen Sie, dass die Matrix $C = \begin{pmatrix} i & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ nicht unitär ist.

(e) Ist die Matrix AC unitär? Wie sieht es mit CA aus? Muss man die fraglichen Matrizen dazu wirklich ausrechnen?